

水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料

ペントキサゾン

・評価対象農薬の概要

1．物質概要

化学名	3 - ( 4 - クロロ - 5 - シクロペンチルオキシ - 2 - フルオロフェニル ) - 5 - イソプロピリデン - 1 , 3 - オキサゾリジン - 2 , 4 - ジオン				
分子式	C <sub>17</sub> H <sub>17</sub> ClFNO <sub>4</sub>	分子量	353.78	CAS NO.	110956-75-7
構造式					

2．作用機構等

ペントキサゾンはオキサゾリジンジオン骨格を有する除草剤であり、その作用機構は、光存在下で活性酸素を発生させることによる細胞構造の破壊であると考えられる。本邦での初回登録は1997年である。

製剤は粒剤、水和剤及び乳剤が、適用作物は稲、雑穀等がある。

原体の国内生産量は、3.7t（20年度）、輸入量は102.0t（20年度）、133.0t（21年度）、72.0t（22年度）であった。

年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧-2011-（（社）日本植物防疫協会）

## 3 . 各種物性等

外観・臭気	白色結晶性粉末、無臭	土壌吸着係数	土壌吸着性が強い ため測定不能
融点	104	オクタノール / 水分配係数	$\log P_{ow} = 4.66$ ( 25 )
沸点	230 付近で変性のため測定不能	生物濃縮性	BCF <sub>ss</sub> = 504 ( 試験濃度 0.01mg/L ) BCF <sub>ss</sub> = 608 ( 試験濃度 0.1mg/L )
蒸気圧	$1.11 \times 10^{-5}$ Pa 以下 ( 25 )	密度	1.4 g/cm <sup>3</sup> ( 25 )
加水分解性	半減期 36 日 ( pH4、25 ) 22 日 ( pH5、25 ) 5 日 ( pH7、25 ) 2 時間 ( pH9、25 )	水溶解度	0.216 mg/L ( 25 )
水中光分解性	半減期 16 日 ( 東京春季太陽光換算 80 日 ) ( 緩衝液、25 、18.4W/m <sup>2</sup> ( 290 - 400nm )及び 142 W/m <sup>2</sup> ( 290 - 800nm ) ) 5 日 ( 東京春季太陽光換算 20 日 ) ( 自然水、25 、18.4W/m <sup>2</sup> ( 290 - 400nm )及び 142 W/m <sup>2</sup> ( 290 - 800nm ) )		

## . 安全性評価

許容一日摂取量 ( ADI )	0.23 mg/kg 体重/日
<p>食品安全委員会は、平成 21 年 10 月 22 日付けで、ペントキサゾンの ADI を 0.23 mg/kg 体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。</p> <p>なお、この値は、イヌを用いた 1 年間慢性毒性試験における無毒性量 23.1 mg/kg 体重/日を安全係数 100 で除して設定された。</p>	

## ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC）

水田農薬として、水濁 PEC が最も高くなる使用方法について表のパラメーターを用いて水濁 PEC を計算する。

### 1．水田使用時の水濁 PEC

使用方法		各パラメーターの値	
剤 型	1.5%粒剤	$I$ : 単回の農薬使用量 (有効成分 g /ha)	450
	4.5%粒剤		450
使用場面	水田	$N_{app}$ : 総使用回数 (回)	2
適用作物	稲 稲	$A_p$ : 農薬使用面積 (ha)	50
農薬使用量	3 kg/10a 1 kg/10a		
総使用回数	1 回 1 回		
地上防除/航空防除	地 上		
施 用 法	湛水散布		
	湛水散布		

### 2．水濁 PEC 算出結果

使用場面	水濁 PEC <sub>Tier1</sub> (mg/L)
水田使用時	0.01198 ...
非水田使用時	適用無し
合 計 <sup>1)</sup>	0.01198 ... ÷ <u>0.012 (mg/L)</u>

<sup>1)</sup> 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。

## 総合評価

### 1. 水質汚濁に係る登録保留基準値（案）

公共用水域の水中における予測濃度 に対する基準値	<b>0.61 mg/L</b>
以下の算出式により登録保留基準値を算出した。 <sup>1)</sup>	
0.23 (mg/kg 体重/日) × 53.3 (kg) × 0.1 / 2 (L/人/日) = 0.6129(mg/L)	
ADI                      平均体重      10 %配分      飲料水摂取量	

<sup>1)</sup> 登録保留基準値は有効数字 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨てて算出した。

#### < 参考 > 水質に関する基準値等

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 <sup>1)</sup>	2mg/L
水質要監視項目 <sup>2)</sup>	なし
水質管理目標設定項目 <sup>3)</sup>	なし
ゴルフ場暫定指導指針 <sup>4)</sup>	なし
WHO 飲料水水質ガイドライン <sup>5)</sup>	なし

<sup>1)</sup> 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。

<sup>2)</sup> 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質に係る指針値。

<sup>3)</sup> 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る目標値。

<sup>4)</sup> 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改正について」（平成 22 年 9 月 29 日付け環水大土発第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。

<sup>5)</sup> Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda

### 2. リスク評価

水濁  $PEC_{Tier1} = 0.012$  (mg/L) であり、登録保留基準値 0.61 (mg/L) を超えないことを確認した。

#### （参考）食品経由の農薬理論最大摂取量と対 ADI 比

農薬理論最大摂取量 (mg/人/日) <sup>1)</sup>	対 ADI 比 (%) <sup>2)</sup>
0.017	0.1

<sup>1)</sup> 食品経由の農薬理論最大摂取量は、平成 22 年 6 月 2 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における食品群毎の基準値案を基に算出した理論最大摂取量を示す。

<sup>2)</sup> 平均体重 53.3 kg で計算