


水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料

マンジプロパミド

. 評価対象農薬の概要

1. 物質概要

化学名	2 - (4 - クロロフェニル) - N - [3 - メトキシ - 4 - (プロパ - 2 - イニルオキシ) フェネチル] - 2 - (プロパ - 2 - イニルオキシ) アセトアミド (別名マンジプロパミド)				
分子式	C ₂₃ H ₂₂ ClNO ₄	分子量	411.88	CAS NO.	374726-62-2
構造式					

2. 開発の経緯等

マンジプロパミドはマンデルアミド系（またはマンデリック酸アミド系）の殺菌剤であり、本邦では現在未登録である。

平成 18 年 12 月に農薬取締法に基づく新規登録申請（適用作物：ばれいしょ、だいず、ぶどう等）がなされている。

3. 各種物性等

外観・臭気	淡褐色粉末、無臭		土壌吸着係数	$K_{F^{ads}_{oc}} =$ 782 ~ 1294 (20.3)、 535 (25.1)
密度	1.24 g/cm ³ (22)		オクタノール / 水分配係数	$\log P_{ow} = 3.2$ (25)
融点	96.4 ~ 97.3			
沸点	測定不能 (200 で分解のため。)		生物濃縮性	BCF = 35 (水中濃度 3.2 ppb)、48 (水中濃度 32ppb) (魚種はファットヘッド・ミノ)
蒸気圧	9.4×10^{-7} Pa (20、25 及び 50)		水溶解度	4.2 mg/L (25)
土壌残留性 (推定半減期)	畑地	圃場試験	火山灰、軽埴土	約 101 日 (約 98 日) ¹⁾
			沖積、埴壤土	約 27 日 (約 27 日) ¹⁾
		容器内試験	火山灰、軽埴土	約 78 日 (約 102 日) ¹⁾
			沖積、埴壤土	約 219 日 (約 241 日) ¹⁾

水質汚濁性 (推定半減期)	試験水田	-	-
		-	-

1) 括弧内の推定半減期は、マンジプロパミドの測定値及び代謝分解物 B の測定値（マンジプロパミドに換算した値）の合計値について算出された推定半減期を示す。

代謝分解物 B : 2-(4-クロロフェニル)-2-ヒドロキシ-N-[2-(3-メチル-4-フルオロ-2-イソプロピルフェニル)エチル]アセアミド
(略称CGA 380778)

安全性評価

許容一日摂取量 (ADI)	0.05 mg/kg 体重/日
<p>食品安全委員会は、平成 20 年 7 月 17 日付けで、マンジプロパミドのADIを 0.05 mg/kg 体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。</p> <p>なお、この値はイヌを用いた 1 年間慢性毒性試験における無毒性量 5 mg/kg 体重/日を安全係数 100 で除して設定された。</p>	

水質汚濁予測濃度（水濁PEC）

非水田使用農薬として、水濁PECが最も高くなる使用方法について算出する。

(1) 非水田使用時の水濁PEC

水濁PECが最も高くなる以下の使用方法の場合について、以下のパラメーターを用いて算出する。

使用方法		各パラメーターの値	
剤 型	23.3%水和剤	I : 単回の農薬使用量（有効成分 g/ha）	544
使用場面	非水田（果樹）	N_{app} : 総使用回数（回）	2
適用作物	ぶどう	A_p : 農薬使用面積（ha）	37.5
農薬使用量	700L / 10a		
希釈倍数	3000 倍		
総使用回数	2 回		
地上防除/航空防除	地 上		
施 用 法	散 布		

（ 2 ）水濁 P E C 算出結果

使用場面	水濁 P E C Tier1 (mg/L)
水田使用時	適用なし
非水田使用時	0.0000203...
うち地表流出寄与分	0.0000184...
うち河川ドリフト寄与分	0.00000184...
合 計 ¹⁾	0.0000203... ≒ <u>0.000020 (mg/L)</u>

¹⁾水濁 P E C の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。

・ 総 合 評 価

1 . 水質汚濁に係る登録保留基準値

公共用水域の水中における予測濃度 に対する基準値	0.1 mg/L
BCF が 5000 以下であることから、生物濃縮性は考慮せず、以下の算出式により登録保留基準 値を算出した。 ¹⁾	
$0.05 \text{ (mg/kg 体重/日)} \times 53.3 \text{ (kg)} \times 0.1 / 2 \text{ (L/人/日)} = 0.13... \text{ (mg/L)}$	
A D I	平均体重 10 % 配分 飲料水摂取量

¹⁾ 登録保留基準値は有効数字 1 桁（ADI の有効数字桁数）とし、2 桁目を切り捨てて算出した。

< 参考 > 水質に関する基準値等

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 ¹⁾	なし
水質要監視項目 ²⁾	なし
水質管理目標設定項目 ³⁾	なし
ゴルフ場暫定指導指針 ⁴⁾	なし
水質評価指針 ⁵⁾	なし
WHO 飲料水水質ガイドライン ⁶⁾	なし

¹⁾ 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。

- 2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質に係る指針値。
- 3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る目標値。
- 4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について」(平成 2 年 5 月 24 日付け環水土 77 号環境庁水質保全局長通知)において設定された指針値。
- 5) 「公共用水域等における農薬の水質評価指針について」(平成 6 年 4 月 15 日付け環水土第 86 号環境庁水質保全局長通知)において設定された指針値。
- 6) Guidelines for Drinking-water Quality (First addendum to 3rd edition)

2. リスク評価

水濁 P E C_{Tier1} = 0.000020 (mg/L) であり、登録保留基準値 0.1 (mg/L) を下回っている。

3. 農薬理論最大摂取量と対 A D I 比

農薬理論最大摂取量 (mg/人/日) ¹⁾		備考
食品経由 ²⁾	小計 1.2587 mg	
水質経由	飲料水 0.2 mg	0.1 mg/L × 2 L/人/日 (基準値案) (飲料水摂取量)
農薬理論最大摂取量 1.4587 mg		
A D I (mg/人/日) ³⁾ 2.665 mg		
対 A D I 54.7 %		
----- (うち食品経由) 47.2 %		
----- (うち水質経由) 7.5 %		

1) 表中の数値の一部は、計算過程において算出された値を機械的に記載したものであり、必ずしも有効数字桁数に対応した数値ではない。

2) 食品規格については、平成 20 年 8 月 7 日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会において了承された各食品群の基準値案を基に算出された理論最大摂取量を示す。

3) 平均体重 53.3 kg で計算