


水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料

フェノチオカルブ

I. 評価対象農薬の概要

1. 物質概要

化学名 (IUPAC)	S-4-フェノキシブチル=ジメチル (チオカルバマート)				
分子式	C ₁₃ H ₁₉ NO ₂ S	分子量	253.4	CAS NO.	62850-32-2
構造式					

2. 作用機構等

フェノチオカルブは、チオールカーバメート系の殺ダニ剤であり、その作用機構は、生体内で変化したスルホキシドが酵素等をカルバモイル化することによる、種々の代謝経路の阻害と考えられている。

本邦での初回登録は1986年である。

製剤は乳剤が、適用農作物等は果樹がある。

製剤の国内生産量は、0.0t^{※1} (平成23年度^{※2})、10.3t (平成24年度^{※2})、0.0t^{※1} (平成25年度^{※2})であった。

※1：50kg未満

※2：年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧・2014・（社）日本植物防疫協会

3. 各種物性等

外観・臭気	白色結晶、弱いゴム臭	土壌吸着係数	$K_{F^{ads}_{OC}} = 740 - 1,500$ (25°C)
融点	39.5°C	オクタノール ／水分配係数	$\log Pow = 3.51$ (20°C、pH7.1)
沸点	248.4°C (3,990Pa) 346.4°C (大気圧)	生物濃縮性	$BCF_{ss} = 48$ (0.05µg/L) = 55 (0.5µg/L)
蒸気圧	2.7×10^{-4} Pa (25°C)	密度	1.2 g/cm ³ (20°C)
加水分解性	半減期 1年以上 (25°C ; pH4、7、 9)	水溶解度	33.8 mg/L (20°C)
水中光分解性	半減期 6.3 日 (自然水、25°C、49.2 W/m ² 、300-400 nm) 6.8 日 (滅菌蒸留水、25°C、49.2 W/m ² 、300-400 nm) 24.1 日 (東京春季太陽光換算日 165 日) (滅菌蒸留水、25°C±2°C、59.0 W/m ² 、300-400 nm) 11.5 日 (東京春季太陽光換算 78.9 日) (滅菌フミン酸ナトリウム水溶液、25°C±2°C、59.0 W/m ² 、300-400 nm)		

II. 安全性評価

一日摂取許容量 (ADI)	0.015 mg/kg 体重/日
<p>食品安全委員会は、平成 26 年 12 月 2 日付けで、フェノチオカルブの ADI を 0.015 mg/kg 体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。</p> <p>なお、この値はイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量1.5 mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定された。</p>	

Ⅲ. 水質汚濁予測濃度（水濁 PEC）

1. 製剤の種類及び適用農作物等

農薬登録情報提供システム（（独）農林水産消費安全技術センター）によれば、本農薬は製剤として乳剤があり、果樹に適用がある。

2. 水濁 PEC の算出

（1）非水田使用時の水濁 PEC（第1段階）

非水田使用時において、PECが最も高くなる使用方法（下表左欄）について、第1段階のPECを算出する。算出に当たっては、テストガイドラインに準拠して下表右欄のパラメーターを用いた。

PEC 算出に関する使用方法		各パラメーターの値	
適用農作物等	果樹	I : 単回・単位面積当たりの有効成分量 (有効成分 g /ha) ($=700 \times 10^3 \text{mL}/10\text{a} \div 700 \times 1\text{g}/1\text{mL} \times 0.35 \times 100\text{a}/\text{ha}$)	3,500
剤 型	35%乳剤	N_{app} : 総使用回数 (回)	2
当該剤の単回・単位面積当たり最大使用量 ※算出値	1,000mL/10a ($=700 \times 10^3 \text{mL}/10\text{a} \div 700$)	D_{river} : 河川ドリフト率 (%)	5.8
使用する際の希釈倍数等	700 倍に希釈	Z_{river} : 河川ドリフト面積 (ha)	0.11
地上防除/航空防除の別	地上防除	R_u : 畑地からの農薬流出率 (%)	0.02
使用方法	散布	A_p : 農薬使用面積 (ha)	37.5
総使用回数	2 回	F_u : 使用方法による農薬流出補正係数	1

（2）水濁 PEC 算出結果

使用場面	水濁 PEC (mg/L)
水田使用時	適用なし
非水田使用時(第1段階)	0.0001306...
うち地表流出寄与分	0.0001187...
うち河川ドリフト寄与分	0.0000118...
合 計 ¹⁾	0.0001306... ≒ <u>0.00013 (mg/L)</u>

¹⁾ 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。

IV. 総合評価

1. 水質汚濁に係る登録保留基準値

登録保留基準値	0.039 mg/L
以下の算出式により登録保留基準値を算出した。 ¹⁾	
0.015 (mg/kg 体重/日) ADI	× 53.3 (kg) 体重 × 0.1 10%配分 ÷ 2 (L/人/日) 飲料水摂取量 = 0.0399...(mg/L)

¹⁾ 登録保留基準値は、体重を 53.3kg、飲用水を 1 日 2L、有効数字は 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨てて算出した。

<参考> 水質に関する基準値等

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 ¹⁾	なし
水質要監視項目 ²⁾	なし
水質管理目標設定項目 ³⁾	なし
ゴルフ場暫定指導指針 ⁴⁾	なし
WHO 飲料水水質ガイドライン ⁵⁾	なし

¹⁾ 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。

²⁾ 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質に係る指針値。

³⁾ 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る目標値。

⁴⁾ 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月 29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。

⁵⁾ Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, incorporating first and second addenda

2. リスク評価

水濁 PEC は 0.00013 mg/L であり、登録保留基準値 0.039 mg/L を超えないことを確認した。

(参考) 食品経由の農薬理論最大一日摂取量と対 ADI 比

農薬理論最大一日摂取量(mg/人/日)	対 ADI 比 (%)
0.0109	1.3

出典:平成 27 年 5 月 27日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会資料

<検討経緯>

平成 27 年 7 月 17 日 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第 46 回）